

95 年第一次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員、
中醫師、心理師、呼吸治療師、營養師、獸醫人員考試試題

代號：2115
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：呼吸治療師
科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)本試題禁止使用電子計算器。

- 依 Fick's law 擴散 (diffusion) 速率與下列何者呈反比？
(A) 厚度 (B) 面積
(C) 氣體擴散係數 (diffusion coefficient) (D) 兩側壓力差
- 病患呈現發紺 (cyanosis) 時，表示微血管血液中的未飽和血紅素 (unsaturated hemoglobin) 超過多少數值？
(A) 1 至 2 g/dL (B) 3 至 4 g/dL (C) 5 至 6 g/dL (D) 7 至 8 g/dL
- 下列何者不是 High anion gap 之代謝性酸中毒之原因？
(A) 乳酸中毒 (B) 甲醇 (methanol) 中毒
(C) Ethylene glycol 中毒 (D) 腹瀉引致重碳酸根離子 (HCO_3^-) 流失
- 病患斜躺 45 度，頸靜脈壓 (jugular venous pressure) 為 sternal angle 上方垂直高度 6 cm，表示病患處於下列何種情況？
(A) 低血壓 (B) 高血壓 (C) 液體過多 (D) 脫水
- 施行動脈氣體分析最適合之抽血位置為：
(A) 臂動脈 (Brachial artery) (B) 橈動脈 (Radial artery)
(C) 尺動脈 (Ulnar artery) (D) 股動脈 (Femoral artery)
- 在 Postacute care setting，醫師開立長期使用氧氣 (long-term oxygen therapy) 之醫囑時，處方上不應記載有：
(A) 與低血氧相關之診斷 (B) 動脈血液氣體分析 (ABG) 與 SaO_2 結果
(C) 氧氣流量與氧氣濃度，使用頻率與時間 (D) prn O_2 之處方
- 血氧下降 (hypoxemia) 之原因中，下列何者對氧氣治療效果最差？
(A) Hypoventilation (B) \dot{V}_E/\dot{V}_T mismatch (C) Shunt (D) Diffusing impairment
- 下列何種情況會使氧氣解離曲線右移？
(A) Carboxyhemoglobinemia (一氧化碳中毒) (B) 二氧化碳分壓下降
(C) 溫度下降 (D) 酸血症 (Acidosis)
- 有關血漿量 (plasma volume) 之控制，下列敘述何者正確？
(A) 血量 (blood volume) 增加，可抑制心房內及靜脈之壓力接受體 (baroreceptors)
(B) 刺激壓力接受體會增加 ADH 及 aldosterone，減少 ANF (atrial natriuretic factor)
(C) ADH 及 aldosterone 分別會促進水份和鈉再吸收，使血量增加
(D) 血量增加會減少腎臟血流灌注 (renal perfusion)
- 有關心搏量 (cardiac output) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 於健康者，增加前負荷 (preload) 可增加心搏量
(B) 增加後負荷 (afterload) 亦可增加心搏量，尤其心臟衰竭時
(C) 組織缺氧及酸血症時，心臟收縮下降，心搏量減低
(D) 健康之心臟，心跳數愈高 (高達 160-180 次/分) 會增加心搏量
- 下列有關誘導型呼吸容積儀療法 (incentive spirometry; IS) 之說明，何者正確？
(A) 容積型 (volumetric) 較流量型 (flow-oriented) 效果較好
(B) 使用簡便，所需病人配合度低
(C) Triflow 屬流量型，使用時以能吸越多球越好
(D) IS 主要為模擬 sustained maximal inspiration (SMI)

- 12 根據 AARC guideline，incentive spirometry 之 breath-hold 最少須維持多久？
(A) 3 秒 (B) 4 秒 (C) 5 秒 (D) 6 秒
- 13 一位急診病患，當 $FiO_2 : 0.4$ 時，測得 $PaO_2 : 70 \text{ mmHg}$ 、 $PaCO_2 : 40 \text{ mmHg}$ ， $pH : 7.379$ ，則其 $P(A-a)O_2$ 為多少 mmHg ？
(A) 285 (B) 235 (C) 165 (D) 95
- 14 下列有關立姿時肺生理之敘述，何者錯誤？
(A) 肺底部之通氣量 (ventilation) 較小 (B) 肺底部之血流灌注 (perfusion) 較大
(C) 肺尖之氧氣分壓較大 (D) 肺尖之 V/Q 比較大
- 15 施行肺功能檢查時，受檢者之 flow rates 報告，應以何種條件為基準？
(A) ATPS (B) BTPS (C) STPD (D) BTPD
- 16 下列何種肺功能檢查對於重度肺氣腫病患之全肺量 (total lung capacity) 的測量最準確？
(A) Helium dilution (B) Single-breath nitrogen washout
(C) Seven-minute nitrogen washout (D) Body plethysmography
- 17 肺功能檢查 forced expiratory maneuver 之 end-of-test 標準，要求受檢者之吐氣時間至少須維持幾秒以上？
(A) 5 秒 (B) 6 秒 (C) 8 秒 (D) 10 秒
- 18 下列那些項目之和等於 total lung capacity (TLC)？① functional residual capacity (FRC) ② residual volume (RV) ③ tidal volume ④ inspiratory capacity (IC)
(A) ① + ③ (B) ② + ④ (C) ① + ② (D) ① + ④
- 19 下列何種檢查對於氣喘 (asthma) 之診斷沒有幫助？
(A) Diffusion study (B) Flow-volume loop (C) Bronchodilator test (D) Airway resistance
- 20 下列何種疾病為飛沫傳染？
(A) 退伍軍人症 (B) 麻疹 (C) 德國麻疹 (D) 水痘
- 21 下列何種情形，在叩診時觸覺震動 (Tactile fremitus) 會增加？
(A) 肺水腫 (B) 氣胸 (C) 肋膜腔積液 (D) 胸壁增厚
- 22 若無單人房可安置具有飛沫傳染性之病患時，床位應與其他病患至少間隔多少距離以上？
(A) 1 英尺 (B) 2 英尺 (C) 3 英尺 (D) 5 英尺
- 23 於病房執行支氣管擴張劑噴霧治療的醫囑時，卻遇到因肺炎住院之氣喘病患拒絕接受治療，你確信該病患的神智狀態完全清醒，此時呼吸治療師應如何處理？
(A) 仍應強制病患接受治療，以免呼吸衰竭
(B) 將藥物及設備置於床側，使用與否由病患自行決定
(C) 請醫護人員協助會診身心科
(D) 與病患充分溝通後，仍尊重病患拒絕治療的權利，於病歷上記載清楚，並轉告負責醫師
- 24 下列何種吸入治療方法，藥物於口咽部沉積最多？
(A) DPI (dry powder inhaler) (B) MDI (metered-dose inhaler)
(C) MDI/HC (holding chamber) (D) Nebulizer
- 25 下列何種吸入治療方法，藥物於空氣中散失最多？
(A) DPI (B) MDI
(C) MDI/HC (holding chamber) (D) Nebulizer
- 26 噴霧粒子之大小決定吸入藥物於呼吸道沉澱之位置，如果希望藥物落於下呼吸道 (lower airway)，則適當之顆粒大小 MMAD (mass median aerodynamic diameter) 為：
(A) $>5 \mu\text{m}$ (B) $2-5 \mu\text{m}$ (C) $0.5-1 \mu\text{m}$ (D) $<0.1 \mu\text{m}$
- 27 當氣管內插管病人使用加熱型濕化器 (heated humidifier)，目前 AARC guideline 建議吸入氣體溫度及濕度為何？
(A) $33 \pm 2^\circ\text{C}$ ，提供 30 mg/L 濕氣 (B) $35 \pm 2^\circ\text{C}$ ，提供 38 mg/L 濕氣
(C) $37 \pm 2^\circ\text{C}$ ，提供 44 mg/L 濕氣 (D) $38 \pm 2^\circ\text{C}$ ，提供 46 mg/L 濕氣

- 28 下列何者不屬於常見之院內呼吸道感染源？
(A)呼吸器管路之 condensate (B) Humidifier
(C)呼吸器的內部元件 (internal machinery) (D) Suction catheter
- 29 為避免院內感染，住院病人使用之 nebulizer 需多久更換一次？
(A) 1 天 (B) 2 天 (C) 3 天 (D) 7 天
- 30 根據 AARC guideline，下列何者不是使用 HME (Heat and Moisture Exchanger) 之禁忌？
(A)大量濃痰或血痰 (B)每分鐘呼吸容積 (minute volume) >10 升
(C)吐氣潮容積小於吸氣潮容積之 70% (D)發燒、體溫>38°C
- 31 根據 AARC guideline，下列何者是 Directed cough 治療的相對禁忌症？
(A)支氣管擴張症 (B)慢性支氣管炎 (C)急性心肌梗塞 (D)肺栓塞
- 32 依據 AARC guideline，下列拔除 ET tube 準則，何者錯誤？
(A) Work of breathing<0.8 J/L (B) Vital capacity>10 mL/kg ideal body weight
(C) MIP>30 cm H₂O (D)成年病患之 rapid shallow breathing index>98-130
- 33 根據 AARC guideline，為使用呼吸器病患執行 Endotracheal Suction 時，每次抽痰時間約為多久？
(A) 5 至 9 秒 (B) 10 至 15 秒 (C) 16 至 20 秒 (D) 21 至 25 秒
- 34 根據 AARC guideline，吸入治療 (aerosol therapy) 之使用藥物不包括：
(A) β -adrenergic (B) anticholinergic (C) 抗生素 (D)鈣離子阻斷劑
- 35 根據 AARC guideline，下列何者為 IPPB 之絕對禁忌症？
(A)腦壓超過 15 毫米汞柱 (B)未治療之張力性氣胸 (tension pneumothorax)
(C)未治療之活動性肺結核 (D)氣管食道瘻管 (Tracheoesophageal fistula)
- 36 依 AARC guideline，單純之霧氣治療 (Bland aerosol therapy) 之適應症不包括：
(A)支氣管收縮 (bronchoconstriction) (B)喉氣管支氣管炎 (layngotracheobronchitis)
(C)拔除氣管內管後之水腫 (D)收集痰液標本以利痰液檢查
- 37 依據 AARC guideline，下列何者非考慮使用 Closed Suctioning Techniques 之時機？
(A) PEEP \geq 10 cmH₂O (B) Inspiratory time \leq 1.5 sec
(C)使用呼吸器病患患有活動性肺結核 (D) Fraction of inspired oxygen \geq 0.60
- 38 依據 AARC guideline，下列何者為居家長期氧氣治療的適應症？
(A)已被診斷為慢性低血氧患者
(B)成年人 PaO₂ \leq 55 torr，SaO₂<88% (room air)
(C)無併發症之睡眠呼吸中止 (sleep apnea) 徵候群病患
(D)肺心症或心臟衰竭等患者併發低血氧 (PaO₂=56~59 torr，SaO₂ \leq 89%)
- 39 熱濕交換器 (HME) 如果沒有被呼吸道分泌物塞住，最久可以幾天更換一次？
(A)二天 (B)四天 (C)六天 (D)八天
- 40 病患吸入較冷空氣便會引起咳嗽，如需濕氣治療時應選用：
(A)加熱型濕化器 (heated humidifier)
(B) Heated aerosol
(C)熱濕交換器 (heat and moisture exchanger, HME)
(D) Hygroscopic HME
- 41 要收集引導痰液 (Sputum induction)，建議採用何種氣霧？
(A) 0.45%食鹽水 (half saline) (B)生理食鹽水 (normal saline)
(C) 3-10%食鹽水 (D) 5%葡萄糖液
- 42 Ethylene oxide 用於呼吸治療設備之處理，下列敘述何者為正確？
(A)屬於高階消毒 (high level disinfection)
(B)對於塑膠與橡膠材質均不會造成損害
(C)濃度超過 1%時，易發生爆炸
(D)金屬、玻璃與 PVC 材質之設備於消毒後，可立即使用

- 43 接觸病患黏膜的呼吸治療設備於高階消毒時，下列何者為最適合的消毒藥劑？
(A) Glutaraldehyde (B) Hydrogen peroxide (C) Chlorine (D) Ethylene oxide
- 44 酒精消毒是屬於 CDC 何種階層的化學消毒方式？
(A)低階 (low-level) (B)中階 (intermediate-level)
(C)高階 (high-level) (D)屬於化學滅菌 (sterilization) 方式
- 45 有關 NO (一氧化氮) 治療，下列何者為正確？
(A) NO 為外來氣體，人體內不會自動產生
(B) NO 可使微血管平滑肌收縮，減少通氣肺泡血流，因而減少分流 (shunt)
(C)嬰兒出現缺氧性呼吸衰竭與肺動脈高壓，可使用 NO 治療
(D)廣泛使用於成人之急性呼吸窘迫徵候群 (ARDS)
- 46 下列何者不是氧氣治療之適應症？
(A)證實為動脈血氧下降 (hypoxemia)
(B)急性疾病懷疑有動脈血缺氧，但尚未抽血檢查時
(C)急性心肌梗塞
(D)當病患呈現呼吸及心跳加速，黏膜呈現發紺，但監測氧氣飽和度達 93%
- 47 高壓氧治療之絕對禁忌為：
(A)未控制之高燒 (B)懷孕 (C)未治療之氣胸 (D)慢性鼻竇炎
- 48 一氧化碳中毒時，下列情況何者非高壓氧治療之適應症？
(A)意識障礙 (B)心臟缺氧 (C)有神經精神症狀 (D)面色呈櫻桃紅色
- 49 下列何者不是高壓氧治療之適應症？
(A)潛水夫症 (decompression sickness) (B)氣體栓塞症 (gas embolism)
(C)增加組織供氧量，防止老化 (D)氰酸 (cyanide) 中毒
- 50 下列有關高壓氧治療之敘述，何者錯誤？
(A)單人艙較適合減壓症及氣體栓塞之治療 (B)多人艙內充滿空氣，單人艙大多供應 100% 氧氣
(C)多人艙內病患氧氣供應須使用面罩 (D)操作人員及醫師須有專業證照
- 51 下列高壓氧治療之生理反應之敘述，何者錯誤？
(A)依波義瓦定律 (Boyle's law)，高壓力狀態使氣體體積減小
(B)依亨利定理 (Henry's law) 提高氧氣於血液中溶解液
(C)造成血管擴張，有利組織血流支配
(D)促進血管新生 (Neovascularization)，有助組織修復
- 52 在使用鼻管 (Nasal cannula) 這種低流量氧氣系統 (Low-Flow Oxygen Systems) 時，下列敘述何者錯誤？
(A)張口呼吸會降低 FiO_2 (B)高 I : E 比值會降低 FiO_2
(C)較長的吸氣時間可增加 FiO_2 (D)低潮氣量會增加 FiO_2
- 53 下列何者不是氧氣使用之副作用？
(A)抑制呼吸 (B)致肺崩陷
(C)減少氧氣自由基產生 (D)水晶體後纖維質增生 (retrolental fibroplasia)
- 54 下列有關氧氣毒性之敘述，何者錯誤？
(A)嬰兒對氧氣治療耐性較佳，可使用較高濃度氧氣而無肺傷害
(B)100% 氧氣使用不超過 1 天應屬安全
(C)70% 氧氣使用不超過 48 小時應屬安全
(D)50% 氧氣使用不超過 5 天應屬安全
- 55 下列有關使用氦 (Helium) 治療之敘述，何者錯誤？
(A)使用 Helium 當作治療氣體，主要基於其有低密度之特性，可以降低較大呼吸道之亂流 (turbulent flow) 與病人呼吸功
(B)對某些 COPD 的病人，可以降低呼吸次數與改善呼吸困難
(C)因 Helium 低密度之特性，在做藥物治療當作霧氣載體 (aerosols-transporting vehicles) 會更有效率
(D)因 Helium 低密度之特性，會降低病人咳嗽效率

- 56 當人工氣道產生阻塞的現象時，下列何者非其可能之原因？
(A)病人咬管 (B)氣囊脫出阻塞管路出口
(C)痰塊堵塞 (D)氣囊破掉
- 57 下列有關氣管內管 Cuff 壓力的敘述，何者正確？
(A)現有的 Cuff 多為高容積低壓力設計，因此過度充氣並不會引起氣管組織傷害
(B)只要將 Cuff 充氣，就可以有效預防吸入性肺炎產生
(C)壓力以不超過氣管黏膜微血管灌注壓，以避免減少血流，引起組織傷害
(D)一般可以接受的 Cuff 壓力範圍為 25-30 mmHg
- 58 下列何者不是呼吸器依賴病患居家照護成功之要素？
(A)病患的積極態度 (B)家屬良好的參與度與照護能力
(C)健全的財務 (D)病患身體狀況與有無感染症
- 59 當給予病患氧氣治療時，下列何者不是考慮之重點？
(A)選擇氧療裝置時，須考慮 3Ps 原則 (purpose, patient, performance)
(B)病患的年齡與神智狀態
(C)病患的身高和體重
(D)病患是否有穩定的每分鐘通氣量 (minute ventilation)
- 60 下列何者不是長期居家使用呼吸器的治療目的？
(A)持續與延長生命 (B)改善生活品質
(C)提供符合成本效益之醫療照護 (D)減少吸入性肺炎的產生
- 61 下列有關長期居家使用非侵入性陽壓呼吸器 (NIPPV) 之病患的敘述，何者錯誤？
(A)嚴重的上呼吸道阻塞為相對禁忌 (B)最適於氣管插管病患居家使用
(C)氧氣濃度 >40% 為相對禁忌 (D)無法與 NIPPV 配合之病患不宜使用
- 62 以下何者不是 TTOT (Transtracheal oxygen therapy) 的適應症？
(A)一般長期氧氣治療患者
(B)病人因考慮美觀緣故
(C)使用鼻導管產生併發症者
(D)睡眠呼吸中止徵候群病患使用 CPAP 無法忍受時
- 63 一居家長期氧療病患，使用 100-1b 之液態氧系統，遵照醫囑使用每分鐘 2L 之氧氣治療。目前液態氧槽為半滿狀態，請問此液態氧可使用多久？
(A)約三天 (B)約六天 (C)約十天 (D)約十二天
- 64 COPD 病患做肺部復健後，仍然無法達到下列何種目標？
(A)改善運動時之呼吸困難症狀 (B)改善運動時之脈搏速率增加
(C)減少運動時的 CO₂ 產量 (D)增加病人的 FEV₁
- 65 下列有關肺部復健訓練之敘述，何者錯誤？
(A)可以改善疾病症狀與幫助病患改善活動狀況
(B)有症狀的 COPD 病患可以獲得較多改善
(C)可以改善肺功能，延緩病程
(D)復原運動 (reconditioning) 係結合上、下肢有氧運用與呼吸肌訓練
- 66 肺部復健治療時，下列那一種肺功能指標可用以評估病患的運動耐力？
(A) FEV₁ (forced expiratory volume in 1 sec) (B) FVC (forced vital capacity)
(C) RV (residual volume) (D) MVV (maximum voluntary ventilation)
- 67 有關胸腔物理治療中，下列何者不是姿位變化 (turning) 的禁忌？
(A)不穩定之脊髓神經傷害 (B)嚴重腹瀉
(C)血壓上升 (>10%) (D)顱內壓增高

- 68 下列有關肺部塌陷 (atelectasis) 之敘述，何者錯誤？
(A) 可以分為吸收性肺塌陷 (resorption atelectasis) 與被動性肺塌陷 (passive atelectasis)
(B) 吸收性肺塌陷常見於手術後病患，因呼吸時持續使用較小的潮氣容積造成
(C) 全身麻醉可以導致 FRC (functional residual capacity) 降低，導致肺塌陷
(D) 肺部塌陷可以導致 V/Q mismatch，進而導致動脈血氧過低
- 69 下列有關 IPPB 之使用說明，何者錯誤？
(A) 可改善肺部塌陷
(B) 未經處理的張力性氣胸為絕對禁忌症
(C) 其治療目標中有一項為 spontaneous IC (inspiratory capacity) $\geq 50\%$ of predicted
(D) 可能導致院內感染等併發症
- 70 當病患於姿勢引流時，若要加上叩擊治療，則每個姿勢應最少叩擊幾分鐘？
(A) 1~2 分鐘 (B) 3~5 分鐘 (C) 10 分鐘 (D) 15 分鐘
- 71 有關胸腔物理治療中，Postural drainage therapy 對下列那一種病人最有幫助？
(A) 肺水腫 (B) 肺動脈高壓 (C) 支氣管擴張症 (D) 肺栓塞
- 72 正常的咳嗽反射動作可分成四期，請問肺氣腫的病患可能於那一期功能變差？
(A) 刺激 (irritation) (B) 吸氣 (inspiration) (C) 壓迫 (compression) (D) 排出 (expulsion)
- 73 在給兒童病患抽痰時，使用抽吸真空幫浦的最適當壓力是：
(A) -40mmHg 至 -59mmHg (B) -60mmHg 至 -79mmHg
(C) -80mmHg 至 -99mmHg (D) -100mmHg 至 -119mmHg
- 74 施行侵入性醫療檢查與治療之前，需先確信病患知情同意，並先請病患簽署特殊檢查同意書後，始得進行。此乃屬於下列何種醫學倫理原則？
(A) 自主原則 (B) 行善原則 (C) 不傷害原則 (D) 公平原則
- 75 根據呼吸治療師法第 8 條規定，呼吸治療師執業，應接受繼續教育，每幾年需提出完成繼續教育證明文件，辦理執業執照更新？
(A) 2 年 (B) 4 年 (C) 6 年 (D) 8 年
- 76 根據呼吸治療師法第 14 條規定，呼吸治療師執行業務，應製作紀錄，其紀錄內容不包含下列那些項目？
(A) 醫師指示之內容 (B) 執行呼吸治療之方法及時間
(C) 病人之地址 (D) 治療師交班時互相討論之內容
- 77 根據呼吸治療師法第 15 條及 21 條規定，呼吸治療師受衛生、司法或司法警察機關詢問時，若為虛偽之陳述或報告，應接受之處分，不包括下列何者？
(A) 處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰 (B) 情節重大者，處一個月以上一年以下停業處分
(C) 接受醫學倫理再教育課程 (D) 情節重大者，得廢止其執業執照
- 78 根據呼吸治療師法第 24 條規定，呼吸治療師受停業處分仍執行業務者，應接受何種處分？
(A) 廢止其執業執照 (B) 廢止其呼吸治療師證書
(C) 處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰 (D) 處一年以下有期徒刑
- 79 呼吸治療師法第 16 條規定，呼吸治療師對於因業務而知悉或持有他人之秘密，不得無故洩漏。醫學倫理中也有為病患守密 (confidentiality) 的原則，這乃源自那位學者所提出的理論？
(A) Aristotle (B) Plato (C) Socrates (D) Hippocrates
- 80 根據我國呼吸治療師法之規定，下列何者不具備呼吸治療師考試資格？
(A) 民國九十二年一月十七日起在醫療機構從事呼吸治療業務已滿兩年，但非畢業於呼吸照護學系的中華民國國民
(B) 於教育部認可之國外大學呼吸照護學系畢業的華僑
(C) 於教育部認可之國外大學呼吸照護學系畢業的外國人
(D) 於國內公私立大學呼吸照護學系畢業的華僑

測驗題標準答案

考試名稱： 95年 第一次專技高普考試醫事人員、中醫師、心理師、呼吸治療師、營養師、獸醫人員考試

類科名稱： 呼吸治療師

科目名稱： 基礎呼吸治療學（試題代號：2115）

題 數： 80題

標準答案：

題序	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	C	D	C	B	D	C	D	C	B	D	A	C	A	B	D	B	D	A	C

題序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	C	D	B	D	B	A	C	A	D	C	D	B	D	B	A	B	C	B	A

題序	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	C	B	A	B	C	D	C	D	C	A	C	B	C	A	C	D	C	D	C	D

題序	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	B	A	B	D	C	D	C	B	C	B	C	D	C	A	C	D	C	A	D	A

備 註： 無更正紀錄。