

100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代 號：6306

類科名稱：呼吸治療師

科目名稱：呼吸疾病學

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 30歲不吸菸女性，主訴慢性咳嗽合併少許黏性痰液，通常在夜間發生，特別是清晨5~6點之時，有時會咳醒過來，還合併有胸部壓迫的感覺，偶爾還可聽到喘鳴聲（wheezes）。這種咳嗽病況，應先考量那種疾病？
- A. 支氣管擴張症
 - B. 囊狀纖維化（cystic fibrosis）
 - C. 肺癌
 - D. 夜間型氣喘
2. 呼吸時，胸腔與腹腔的運動，通常方向一致。如果不一致，則稱之為逆向運動或逆理運動（paradoxical movement）。下列何種疾病不會出現此逆理運動？
- A. 阻塞型睡眠呼吸中止症候群病人，呼吸中止時
 - B. 嚴重的COPD或上呼吸道阻塞的病人
 - C. 間質性肺病變
 - D. 呼吸的神經肌肉障礙
3. 代謝性酸血症（metabolic acidosis）時，電解質檢查可以幫助我們計算陰離子間隙（anion gap），則下列有關酸鹼平衡之敘述，何者錯誤？
- A. 陰離子間隙 = $\text{Na}^+ - \text{Cl}^- - \text{HCO}_3^-$
 - B. 正常陰離子間隙約為9-14 mEq/L
 - C. 末期腎衰竭的病人陰離子間隙會上升
 - D. 糖尿病病人造成的糖尿病酮酸中毒（diabetic ketoacidosis）陰離子間隙正常
4. 對需要呼吸照護，而胸部X光影像有疑似肺結核病灶的個案，當痰液結核菌檢查還未有明確結果以前，呼吸治療人員的處置方式，下列何者錯誤？
- A. 如果胸部X光影像看起來像陳舊性纖維化或鈣化性結核病灶，可視同一般病人處置
 - B. 如果胸部X光影像看起來有可能是活動性肺結核病灶，儘量讓病人戴上口罩
 - C. 儘量少給病人噴霧治療，以減少咳嗽，降低細菌傳布機會
 - D. 儘量不要照顧這種病人，以免遭受感染
5. 下列有關呼吸系統的理學檢查，何者正確？
- A. 聽診器聽低聲調呼吸音，需使用膈膜面（Diaphragm）
 - B. 病人發生氣胸那一側，叩診會呈現鼓音（Tympanic）
 - C. 胸廓呈現桶狀胸，這是慢性阻塞性肺病的病人，才會有的表徵
 - D. 聽診有聽到喘鳴聲（Wheezes），這是氣喘才有的表徵
6. 下列關於intrinsic positive end-expiratory pressure的敘述，何者錯誤？
- A. 會減少靜脈血回流
 - B. 會減少心輸出量
 - C. 會造成低血壓
 - D. 可經由增加吸氣時間而減少之
7. 成人氣喘患者急性發作時，下列何者治療支氣管擴張作用產生最快？
- A. 靜脈注射茶鹼
 - B. 吸入formoterol
 - C. 靜脈注射類固醇
 - D. 吸入salmeterol
8. 下列有關茶鹼（theophylline）之敘述，何者正確？
- A. 紅黴素會加速肝臟對茶鹼的代謝作用
 - B. 吸菸會降低肝臟對茶鹼的代謝作用
 - C. 有充血性心臟衰竭（congestive heart failure）之病人使用茶鹼時需減量
 - D. 肺炎患者使用茶鹼時需增加劑量
9. 下列何種環境，最適合塵蟎（mite）繁殖？
- A. 溫度15°C，相對濕度50%
 - B. 溫度25°C，相對濕度50%
 - C. 溫度15°C，相對濕度80%
 - D. 溫度25°C，相對濕度80%

10. 造成肺氣腫 (emphysema) 的致病機轉中最重要之細胞為：
- 嗜中性白血球
 - 嗜伊紅性白血球
 - 嗜鹼性白血球
 - 淋巴球
11. 支氣管擴張症 (bronchiectasis) 的敘述，下列何者錯誤？
- 為後天造成的疾病 (acquired disease) 為主
 - 造成的原因多為感染或氣道阻塞
 - 最嚴重型為囊狀支氣管擴張症 (saccular bronchiectasis)
 - 上肺葉是最好發區域
12. 關於慢性阻塞性肺病患者併發氣胸，下列敘述何者錯誤？
- 病人會出現突發性呼吸困難
 - 患側的呼吸聲會減小
 - 胸部X光表現要與大氣泡 (large bullae) 做鑑別診斷
 - 使用胸管引流超過7天以上需外科治療
13. 關於慢性阻塞性肺病的敘述，下列何者錯誤？
- 呼吸困難 (dyspnea) 的症狀惡化緩慢
 - 呼吸困難 (dyspnea) 的症狀多發生在60~70歲時
 - 年紀較輕出現喘的症狀，或不抽菸卻有肺氣腫變化要考慮 α_1 -antitrypsin缺乏症
 - 不會出現手掌震顫現象 (asterixis)
14. 關於慢性阻塞性肺病急性惡化時的治療原則，下列何者錯誤？
- 可使用霧化支氣管擴張劑
 - 可使用類固醇
 - 使用類固醇靜注方式比口服好
 - 有細菌感染時可使用抗生素
15. 關於慢性阻塞性肺病患者搭飛機旅行，下列敘述何者錯誤？
- 肺部出現大氣泡時，可能會有致命性氣胸的發生
 - 使用 nasal cannula 1~3 L/min 即可達到安全的血氧濃度
 - 飛機的艙壓約等於5000至10000英尺高度
 - 高二氧化碳血症之病患，不可以使用氧氣
16. 慢性阻塞性肺病 (COPD) 的嚴重度測定，主要是依據何者肺功能檢查結果？
- FVC (% predicted)
 - FEV₁ (% predicted)
 - FEV₁/FVC (%)
 - PEFR
17. 有關支氣管擴張症的臨床表現，何者錯誤？
- 慢性反覆性下呼吸道感染
 - 出現喘鳴音 (Wheezing)
 - 咳血
 - 雷諾氏徵象 (Raynaud's phenomenon)
18. 慢性阻塞性肺病對於其他器官系統的影響，下列何種情況較少發生？
- 骨骼肌衰弱
 - 凝血異常
 - 體液電解質失衡
 - 造骨增加
19. 關於慢性氣喘 (chronic asthma) 的處置，何者錯誤？
- Step 3 使用Low to medium dose ICS+LABA
 - Step 1 使用ICS
 - Step 4 病人必要時可使用systemic steroid
 - Step 2 可使用Theophylline
20. 有關氣喘急性發作時喘鳴 (wheezes) 的特徵，下列敘述何者正確？
- 喘鳴通常在吸氣時較明顯
 - 呼氣時間通常會縮短
 - 吸氣時間通常會延長
 - 喘鳴也可在細支氣管炎、氣管內異物或腫瘤病人身上聽到
21. 有關社區型感染 *Acinetobacter baumannii* 肺炎之敘述，下列何者錯誤？
- 是屬於嚴重、猛爆性肺炎
 - > 50% 患者住院24小時內會產生休克 (shock)

- C.50%患者會產生leukopenia
D.極少發生低血氧
- 22.有關咽喉後壁膿瘍（retropharyngeal abscess）之診斷與處置，下列敘述何者錯誤？
A.常見之致病菌為group A streptococci與口腔厭氧菌
B.常見之症狀為吞嚥困難、呼吸不順，甚至有stridor
C.應安排CT或MRI檢查
D.診斷後原則上以抗生素（penicillin或clindamycin）治療為主
- 23.有關流行性感胃病毒（Influenza virus）與臨床呼吸道疾病的關係，下列敘述何者錯誤？
A.流行性感胃A病毒（Influenza A virus）會影響病患血中theophylline之清除，易產生theophylline中毒，流行性感胃B病毒（Influenza B virus）則不會
B.感染流行性感胃A病毒（Influenza A virus）會導致嬰兒（infants）產生 obliterative bronchiolitis 和 chronic pulmonary disease
C.流行性感胃病毒（Influenza virus）是導致成人氣喘急性惡化常見原因
D.流行性感胃病毒（Influenza virus）可造成病患肺功能下降
- 24.有關結核肋膜積液之敘述，下列何者錯誤？
A.屬於滲出性肋膜積液（exudative pleural effusion）
B.主要以淋巴球為主
C.胸部X光表現以單側肋膜積液為主
D.>85%結核肋膜積液患者，肋膜積液會培養出結核菌（M. tuberculosis）
- 25.下列有關吸入性肺炎（aspiration pneumonia）之敘述，何者錯誤？
A.吸入胃酸引起肺臟受損死亡率高
B.吸入胃液之pH值是6
C.常因厭氧菌（anaerobic）的吸入引起肺部感染
D.口腔內的菌叢是重要來源
- 26.有關肺炎合併肋膜積液（parapneumonic effusion）患者，下列那些狀況非胸管置入引流之適應症？
A.肋膜積液革蘭氏染色陽性反應
B.化膿性肋膜積液
C.肋膜積液pH>7.2
D.肋膜積液glucose<60 mg/dL
- 27.有關肺心症（cor pulmonale）的敘述，下列何者錯誤？
A.主要引起右心室衰竭
B.因長期肺靜脈高壓引起
C.可引起肝腫大
D.可引起下肢水腫
- 28.間質性肺疾出現早期呼吸困難症狀時，其動脈血氣體分析結果，下列敘述何者正確？
A.PaO₂降低，PaCO₂降低
B.PaO₂升高，PaCO₂升高
C.PaO₂降低，PaCO₂升高
D.PaO₂升高，PaCO₂降低
- 29.有關紅斑性狼瘡相關的肺部疾病，下列敘述何者正確？①可造成瀰漫性肺泡出血 ②可造成慢性阻塞性疾病 ③可造成肺動脈高壓 ④可造成肋膜積液
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②④
- 30.有關瀰漫性肺泡出血，其出血來源的敘述，下列何者錯誤？
A.肺小動脈
B.微血管
C.肺靜脈
D.肺淋巴管
- 31.下列何者是造成肺血管收縮的重要因素？
A.低血氧
B.高血氧
C.低二氧化碳血症
D.高二氧化碳血症
- 32.下列何者不是鈍傷引起之心臟破裂的機轉？
A.腹腔或下肢之靜脈血大量擠壓入右心房，造成心臟破裂

- B.減速造成心房與腔靜脈交接處之撕裂
C.心肌挫傷、壞死造成心臟破裂
D.胸廓內壓增加
- 33.創傷引起之氣管與支氣管破裂，約有多少百分比會被延遲診斷超過一個月？
A.30%
B.50%
C.2%
D.10%
- 34.對於創傷引起之胸內氣管及支氣管破裂（tracheobronchial disruption）病患之氣道建立，下列敘述何者錯誤？
A.可能使用單肺通氣（one-lung ventilation）
B.可能使用高頻率噴射通氣（high-frequency jet ventilation）
C.決定於那一側肺發生胸內氣管及支氣管破裂
D.不需支氣管鏡幫助經口氣管內管插管
- 35.創傷性血胸（traumatic hemothorax）需要立即引流，何者錯誤？
A.有助於止血
B.可以降低膿胸（empyema）的發生率
C.可以降低纖維胸（fibrothorax）的發生率
D.預防氣胸之發生
- 36.針對有支氣管肋膜瘻管（bronchopleural fistula）之胸部創傷患者，下列有關其治療之敘述，何者正確？
A.可將胸管接上負壓抽吸器，並將壓力設定於-15 cmH₂O
B.不要調整胸管位置，以免肺不會膨脹
C.若支氣管肋膜瘻管氣漏（air leak）超過14天，則需考慮胸腔鏡治療
D.將病患之血約60mL由胸管注入肋膜腔，可促進支氣管肋膜瘻管之閉合
- 37.一個胸腔創傷病患，其胸部X光片出現下列何種變化時，並非懷疑胸腔大血管損傷之指標？
A.胸骨骨折
B.右胸多處肋骨骨折
C.縱膈腔寬度大於8.0公分
D.子彈或砲彈碎片或其彈道出現在大血管附近
- 38.連枷胸（flail chest）病患若經插氣管內管使用呼吸器時，下列關於其脫離呼吸器（weaning）之敘述，何者正確？
A.需在病患胸壁恢復穩定後，才可開始脫離呼吸器
B.使用持續氣道正壓模式（continuous positive airway pressure, CPAP）再加上壓力支持模式（pressure support）較佳
C.脫離呼吸器前之評估與一般呼吸衰竭使用呼吸器病患完全不同
D.使用T-piece模式脫離呼吸器並不會加重病患胸壁扭曲變形
- 39.一車禍病患被送至急診，呈現昏迷、頭頸發紺、臉部水腫、臉部皮膚有出血性瘀點（petechiae），以及眼結膜下出血等情形，最有可能之診斷為：
A.創傷性窒息（traumatic asphyxia）
B.張力性氣胸（tension pneumothorax）
C.主動脈破裂（aorta disrapture）
D.心室顫動（ventricular fibrillation）
- 40.若受到含有低水溶性的有毒氣體之煙霧吸入傷害，則下列敘述何者正確？
A.主要是造成上呼吸道傷害
B.主要是造成下呼吸道及肺泡傷害
C.二氧化硫（SO₂）是屬於水溶性低的氣體
D.氨（ammonia）是屬於水溶性低的氣體
- 41.31歲男性，由6公尺高處跌下，病人到急診室意識清楚，生命徵象穩定，但左胸呼吸聲減少，叩診呈實音（dullness），胸部X光片左胸有小腸環狀腸氣（loop），最佳之治療為：
A.保守治療
B.急作 laparotomy 及橫膈膜修補
C.急作主動脈攝影，排除主動脈破裂
D.急作左側開胸手術
- 42.第一次發生secondary spontaneous pneumothorax的病患，之後的復發率大約是多少？
A.20%
B.30%
C.35%

D.45%

43. 下列有關結締組織疾病引起肋膜積液的敘述，何者正確？
- A. 結締組織疾病引起者，以單側大量肋膜積液為常見
 - B. 紅斑狼瘡引起者，經常合併心包膜積液，即使以類固醇治療，這些積液也不易消失
 - C. 類風濕性關節炎引起者，特徵是低鹼分與偏酸性（low pH值）的肋膜積液
 - D. 類風濕性關節炎引起者，可以造成壁層肋膜纖維化增厚與發生限制肺（trapped lung）
44. 縱膈腔氣腫（pneumomediastinum）與使用下列何種藥物無關？
- A. cocaine
 - B. heroin
 - C. insulin
 - D. cisplatin
45. 下列有關肺部重充氣性肺水腫（re-expansion pulmonary edema）的敘述，何者正確？
- A. 常見於新發生的氣胸，不見於延遲處置的氣胸
 - B. 機轉是肺泡內負壓造成，通常肺血管是正常的
 - C. 以抗氧化劑預防治療，可能可減少肺部重充氣性肺水腫的發生率
 - D. 一般出現於氣胸處置之後，不見於肋膜積液的處置之後
46. 有1~2%的社區性肺炎可能併發膿胸，下列何者不是其中常見的致病菌？
- A. *S. pneumoniae*
 - B. *S. aureus*
 - C. Anaerobes
 - D. *Pseudomonas aeruginosa*
47. 有關lymphoma造成的肋膜積液，下列敘述何者錯誤？
- A. 在引起惡性肋膜積液的癌症中占第三位，僅次於肺癌與乳癌
 - B. 最常見發生於年輕女性
 - C. 常為exudate
 - D. 部分病患甚至可以出現chylothorax
48. 有關神經肌肉疾病的人，其平常呼吸型態的敘述，下列何者正確？
- A. 淺而快
 - B. 深而快
 - C. 淺而慢
 - D. 深而慢
49. 下列有關Guillain-Barré Syndrome的敘述何者正確？
- A. 是漸行性由上而下的癱瘓
 - B. 可以由病毒感染造成
 - C. 病患一定兼有感覺神經異常
 - D. 惡性腫瘤不會造成此疾病
50. 一位26歲男性因騎機車發生車禍，T1脊髓受傷，下列何肌肉會麻痺無力？
- A. 橫膈肌
 - B. 舌肌
 - C. 肋間肌
 - D. 胸鎖乳突肌（Sternocleidomastoid muscle）
51. 下列何者與肺癌的形成無關？
- A. 鋅（zinc）
 - B. 石棉（asbestos）
 - C. 鉻（chromium）
 - D. 氡（radon）
52. 需接受肺葉切除術的肺癌病患，如果肺功能不好，會進一步接受運動心肺功能檢查（cardiopulmonary exercise testing），其 $\dot{V}O_2\max$ 至少大於多少，才有可能適合接受肺葉切除手術？
- A. 50 mL/kg/min
 - B. 30 mL/kg/min
 - C. 15 mL/kg/min
 - D. 5 mL/kg/min
53. 下列何者不是致癌基因（oncogene）？
- A. ras
 - B. myc
 - C. p53

D.src

54. 肺部之良性腫瘤（非感染造成者）中，下列何者最常見？
- A. 缺陷瘤（hamartoma）
 - B. 脂肪瘤（lipoma）
 - C. 硬化性血管瘤（sclerosing hemangioma）
 - D. 平滑肌瘤（leiomyoma）
55. 下列那一種腫瘤常發生於前縱膈腔？
- A. 胸腺瘤（thymoma）
 - B. 神經纖維瘤（neurofibroma）
 - C. 食道癌
 - D. 支氣管囊腫（bronchogenic cyst）
56. 有關單一肺結節（solitary pulmonary nodule），下列何者錯誤？
- A. 直徑小於3公分
 - B. 四週被肺部組織包圍
 - C. 合併有縱膈腔淋巴結病變
 - D. 中心點鈣化較像良性病灶
57. 下列何者不是肺癌常見的症狀？
- A. 咳嗽
 - B. 喘
 - C. 胸痛
 - D. 杵狀指
58. 放射線治療引起的肺炎（radiation pneumonitis）主要的治療為何？
- A. 類固醇
 - B. 抗生素
 - C. 高濃度的氧氣
 - D. 抗癌藥物
59. 肺癌較少轉移到下列那一器官？
- A. 肝臟
 - B. 腎臟
 - C. 骨頭
 - D. 腦
60. 有關戒菸對發生肺癌的危險（risk），多久後會降到與一般人一樣？
- A. 馬上
 - B. 一年
 - C. 五年
 - D. 十到十五年
61. 類癌症候群（carcinoid syndrome）不會有下列何種臨床表現？
- A. 心跳快速
 - B. 皮膚潮紅
 - C. 腹瀉
 - D. 低血壓
62. 有關陽壓呼吸器治療阻塞型睡眠呼吸中止症候群（obstructive sleep apnea syndrome），下列敘述何者正確？
- A. 治療一個月後，仍會出現反彈性深睡期及快速動眼期睡眠
 - B. 很少見嘴巴漏氣
 - C. 治療接受度大於85%
 - D. 治療壓力調整需於睡眠實驗室中進行
63. 關於中樞型睡眠呼吸中止症候群，下列敘述何者錯誤？
- A. 好發於鬱血性心衰竭的病人身上
 - B. 這種典型的呼吸型態叫做陳氏呼吸（Cheyne-Stokes respiration）
 - C. 陳氏呼吸（Cheyne-Stokes respiration）容易造成心臟衰竭
 - D. 主要的致病機轉為動脈二氧化碳分壓（PCO₂）振盪（oscillations）
64. 下列有關睡眠呼吸中止症候群（sleep apnea syndrome）之敘述，何者正確？
- A. 阻塞型是指呼吸氣流中止且沒有呼吸做功
 - B. 中樞型病患血中二氧化碳濃度都會升高
 - C. 中樞型是指呼吸氣流中止且沒有呼吸做功
 - D. 中樞型病患血中二氧化碳濃度都會降低
65. 下列有關小兒阻塞性睡眠呼吸中止症的敘述，何者正確？

- A.小兒睡眠檢查診斷標準與成人相同
B.病患大多有扁桃腺肥大的情形
C.病患最常見的症狀是白天嗜睡
D.病患應優先使用正壓呼吸器治療
- 66.關於鼻罩式正壓呼吸器應用於阻塞性睡眠呼吸中止症的治療，下列敘述何者錯誤？
A.從病患治療1個月的順應性（compliance）大約可預估其繼續治療3個月的情形
B.病患對自動型持續氣道正壓呼吸器（auto-CPAP）與固定壓力正壓呼吸器（fixed pressure level）的接受度差不多
C.呼吸器的壓力調愈高，愈不會呼吸中止，病患感覺比較舒適
D.密切追蹤病患使用正壓呼吸器的狀況，並及時解決發生的問題（包括面罩漏氣、口乾不適）可以明顯提升病患長期治療的意願
- 67.下列何者並非阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）引起併發症的機制？
A.所引起的交感神經活化會造成高血壓
B.所引起的睡眠間斷會引起日間過度嗜睡
C.所引起的併發症機制最主要為慢性持續性缺氧
D.會引起腦血流變化造成腦血管病變
- 68.在一般情況下，關於換氣驅動力（ventilatory drive）機轉，下列敘述何者錯誤？
A.代謝性酸中毒（metabolic acidosis）引起的換氣驅動力比缺氧（hypoxia）強
B.缺氧（hypoxia）可促進周邊化學接受體（peripheral chemoreceptor）對H⁺的敏感度
C.代謝性鹼中毒（metabolic alkalosis）時，會減弱缺氧（hypoxia）對換氣驅動力效果
D.二氧化碳可直接刺激中樞及周邊化學接受體（peripheral chemoreceptor），不需要轉換成其他分子
- 69.根據國際睡眠疾病分類第二版（ICSD-2）的定義，下列那一種疾病屬於睡眠呼吸障礙？
A.原發性失眠
B.猝睡症
C.週期性肢動症
D.阻塞性睡眠呼吸中止症
- 70.關於哮吼（croup）之敘述，下列何者錯誤？
A.又稱喉部、主氣管與支氣管發炎
B.最常出現於六至十二歲
C.病毒感染是常見原因
D.會出現狗吠樣咳嗽（barky cough）
- 71.患有嚴重神經肌肉疾病的兒童，不適合使用下列那一種呼吸支持方法？
A.長期單純氧氣治療
B.非侵入性陽壓呼吸支持
C.侵入性陽壓呼吸支持
D.咳嗽輔助器
- 72.下列何種情況，最不容易造成新生兒呼吸減緩？
A.藥物
B.缺氧
C.胃食道逆流
D.焦慮
- 73.喉頭軟化症的哮鳴聲（stridor），不會因下列何情況而惡化？
A.哭泣
B.餵食
C.俯臥
D.仰臥
- 74.一位八歲男孩，在學校氣喘發作，被送到急診室，使用高濃度氧氣面罩下，下列何者不是該男童應該置入氣管內管的適應症？
A.在給予短效氣管擴張劑下，血氧濃度持續降低
B.病童躁動不安且意識不清
C.單獨只有高二氧化碳血症
D.病童持續呼吸停止
- 75.醫療衛教人員，需上課程以了解病人教育原則，對於下列那一項，不在美國呼吸照護學會（AARC）臨床指引建議內？
A.學會如何準備教育材料
B.學會建立固定化的教育模式
C.監視病人技巧

D.給予回饋與評估結果

76.在病患教育的項目中，Cognitive 的目的可以透過下列何種方式完成目標？

- A.筆試測驗
- B.實際操作
- C.重複演練
- D.備忘錄

77.下列何者不是穩定狀態的氣喘病患居家每日需記錄的症狀評估分數，以便早期發現氣喘開始惡化？

- A.夜間睡眠
- B.夜間咳嗽
- C.心跳次數
- D.白天活動能力

78.下列有關操作定量吸入器之敘述，何者錯誤？

- A.先用手溫暖定量吸入器藥罐（canister）
- B.使用前須搖動吸入器藥罐（canister）
- C.側持定量吸入器
- D.慢速吸入至全肺量，屏息10秒

79.下列那一種吸入型藥物使用後，病患需要漱口以防止口腔內滋生黴菌？

- A.乙型交感神經刺激劑
- B.Cromolyn sodium（Intel）
- C.皮質類固醇
- D.副交感神經抑制劑

80.氣喘病人居家環境衛教，何者正確？

- A.被褥放在冷水（65°F）洗較能殺滅蟎蟲
- B.室內濕度維持大於50%
- C.不要使用地毯
- D.上午時戶外灰塵量較高，待在室內較佳

測驗式試題標準答案

考試名稱：100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、
 類科名稱：物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試
 科目名稱：呼吸疾病學(試題代號：6306)

題 數：80題

標準答案：

題號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	C	D	D	B	D	B	C	D	A	D	D	D	C	D	B	D	D	B	D

題號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	D	D	A	D	B	C	B	A	B	D	A	D	C	D	D	D	B	B	A	B

題號	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	B	D	C	C	C	D	B	A	B	C	A	C	C	A	A	C	D	A	B	D

題號	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	D	D	C	C	B	C	C	D	D	B	A	D	C	C	B	A	C	C	C	C

題號																				
答案																				

備 註：