

101年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：6306

類科名稱：呼吸治療師

科目名稱：呼吸疾病學

考試時間：1小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列ECG是那一種心律不整？



A.Ventricular tachycardia

B.Ventricular fibrillation

C.Atrial fibrillation

D.Paroxysmal supraventricular tachycardia

2.下列何種病況較不可能出現呼吸困難且合併有喘鳴（wheezes）的聲音？

A.支氣管性氣喘

B.小兒時期的細支氣管炎（bronchiolitis）

C.異物誤吸入至呼吸道內

D.間質性肺炎（interstitial pneumonitis）

3.下列何者無法證明病人的氣喘和職場工作有關？

A.請職場主管出具證明

B.監測尖峰呼氣流速（PEFR），若上工日PEFR明顯遽降，休息日回升，即可能是職場氣喘

C.調查同職場工作人員，氣喘盛行率是否上升

D.使用取自職場的過敏原施行誘發試驗（provocation test）

4.正常人的通氣－灌注比值（ventilation-perfusion ratio）約為：

A.10~20

B.100~150

C.0.1~0.5

D.0.8~1

5.下列何項疾病，比較會造成病人有杵狀指（Clubbing finger）的情形？

A.肋膜積水

B.急性肺栓塞

C.亞急性心內膜炎

D.慢性腎絲球腎炎

6.有關定量噴霧劑（MDI）的使用，下列敘述何者錯誤？

A.使用時要將其上下搖動

B.不要將噴霧劑直接置於口部，噴出藥物

C.噴出藥物時，需要用力快速的將霧化的藥物吸入肺臟

D.吸完藥後要馬上閉氣5至10秒

7.下列對塵蟎（mite）之敘述何者錯誤？

A.八隻腳之節肢動物

B.動物皮屑為其主要食物

C.常存在於地毯、床墊被單

D.乾冷環境下繁殖最快

8.依照Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease（GOLD）指引，當病人的肺功能為 $FEV_1 / FVC < 70\%$ ， $FEV_1 = 70\%$ 預測值時，下列治療何者錯誤？

A.可使用吸入型乙型交感神經刺激劑

B.建議接種流感疫苗

C.應使用吸入型類固醇

D.可使用長效吸入型抗膽鹼類（anti-cholinergic）藥物

9.下列何種藥物使用方式對預防運動誘發型氣喘效果最差？

A.運動前20分鐘吸入formoterol

B.運動前40分鐘口服抗白三烯（leukotriene）藥物

C.運動前20分鐘吸入salbutamol

- D.運動前20分鐘口服長效型茶鹼
- 10.慢性阻塞性肺病患者因肺血管收縮造成肺動脈高壓的最主要原因為：
- 酸血症
  - 低血氧症
  - 胸內壓增加
  - 肺血管床（pulmonary vascular bed）減少
- 11.對於慢性阻塞性肺病的敘述，下列何者錯誤？
- 睡眠呼吸中止（sleep apnea）的發生率較高
  - 快速動眼期（REM）較非快速動眼期（non-REM）易出現低血氧症
  - 出現睡眠低血氧症者，並非每位均需睡眠時使用氧氣
  - 夜間低血氧症者不一定會出現紅血球增多症（erythrocytosis）
- 12.慢性阻塞性肺病病人理學檢查出現杵狀指，要考慮合併下列何種疾病？
- 支氣管擴張症
  - 缺血性心臟病
  - 肝癌
  - 消化性潰瘍
- 13.下列那一類病人於注射肺炎疫苗6年以上，不須追加注射肺炎疫苗？
- 脾臟切除者
  - 腎病症候群者
  - 腎臟移植者
  - 氣喘患者
- 14.在評估慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者之預後和死亡率時，下列何者為較佳之預測指標？
- 最大吐氣肺活量（FVC）
  - 骨骼肌無力（skeletal muscle weakness）
  - 臨床症狀
  - Borg index
- 15.臨床上大部分的慢性肺心症（cor pulmonale）是由何種疾病所造成的？
- 原發性肺高壓（primary pulmonary hypertension）
  - 肺癌
  - 慢性阻塞性肺病（COPD）
  - 肺血管栓塞（pulmonary embolism）
- 16.關於職業性氣喘（occupational asthma）的敘述，何者正確？
- 為開發中國家最常見的職業性肺病（occupational lung disease）
  - 約占成人型氣喘（adult-onset asthma）的30%
  - 藥物治療與一般氣喘相似
  - 換工作就會完全痊癒
- 17.慢性阻塞性肺病患者需長期連續使用氧氣治療的適應症是：
- 休息時 $\text{SaO}_2 \leq 92\%$
  - 休息時 $\text{PaO}_2 \leq 55 \text{ mm Hg}$
  - 運動時 $\text{SaO}_2 \leq 92\%$
  - 運動時 $\text{PaO}_2 \leq 55 \text{ mm Hg}$
- 18.下列不是測試氣道過度反應性的方法？
- 吸入抗組織胺（Histamine）
  - 冷空氣（Cold air）
  - 吸入等張食鹽水溶液（Isotonic saline）
  - 運動（Exercise）
- 19.下列關於氣喘造成氣道結構改變的敘述，何者錯誤？
- IL-4與杯細胞增生（goblet cell hyperplasia）有關
  - TNF $\alpha$ 與血管新生（angiogenesis）有關
  - IL-13與平滑肌增生（smooth muscle hyperplasia）有關
  - PDGF與subepithelial fibrosis有關
- 20.下列何者不是與支氣管擴張症相關的疾病？
- 幼兒時下呼吸道感染
  - 體液或細胞免疫缺陷
  - 囊性纖維化（cystic fibrosis）
  - 過敏性鼻炎
- 21.下列有關潛在致命性氣喘（potential fatal asthma）的敘述，何者錯誤？
- 潛在致命性氣喘中小於10%是屬於輕度氣喘病人

- B.有心理社會問題 (psychosocial problems) 的病人  
C.曾因氣喘住進 ICU 的病人  
D.氣喘控制不佳的病人
- 22.下列關於氣喘急性惡化的處置，何者錯誤？  
A.給予氧氣至血氧飽和度大於等於90% (小孩95%)  
B.持續吸入速效乙二型交感神經興奮劑  
C.無立即改善者應給予口服或注射之類固醇治療  
D.躁動不安時應使用鎮靜劑
- 23.某26歲氣喘患者急性發作被送至急診室，下列何者顯示其病情最嚴重？  
A.呼吸次數 = 34/min  
B. PaCO<sub>2</sub> = 49 mmHg  
C.尖峰吐氣流速值 = 300 L/min  
D.血氧飽和度 (SaO<sub>2</sub>) = 91%
- 24.有關奴卡菌病 (nocardiosis) 之敘述，下列何者錯誤？  
A.主要表現為發熱、呼吸急促和躁動  
B.胸部X光表現可以是肺炎、肺膿瘍  
C.治療藥物以抗生素sulfonamide為主  
D.治療時間約兩週
- 25.有關金黃葡萄球菌肺炎 (staphylococcal pneumonia) 與其相關併發症之敘述，何者錯誤？  
A.有25%患者會產生肺膿瘍 (lung abscess)  
B.有3%~10%患者會產生膿胸 (empyema)  
C.成人患者常併發氣囊胞 (pneumatocele) 和膿氣胸 (pyopneumothorax)  
D.可能併發敗血症及心內膜炎
- 26.有關評估社區型肺炎 (community-acquired pneumonia) 患者預後和死亡率預測指標，下列敘述何者錯誤？  
A.男性為預後較差之預測指標  
B.癌症患者為預後較差之預測指標  
C.收縮壓 < 90 mm Hg 為預後較差之預測指標  
D.血糖 (glucose) < 250 mg/dL 為預後較差之預測指標
- 27.一位55歲女性，因咳嗽、發燒畏寒 (40.5°C) 來診，胸部X光發現左下肺浸潤，伴隨頭痛、腹瀉 (diarrhea)、全身肌肉酸痛 (myalgias)，Na = 120 mEq/L、aspartate transaminase (AST) : 80 IU/L, alanine transaminase (ALT) : 100 IU/L；此時，有可能之診斷為何？  
A.黴漿菌肺炎 (mycoplasma pneumonia)  
B.綠膿桿菌肺炎 (pseudomonas pneumonia)  
C.退伍軍人症 (legionellosis)  
D.侵襲性麴菌感染 (invasive aspergillosis)
- 28.造成咳血最常見的原因是：  
A.肺結核  
B.肺癌  
C.肺栓塞  
D.支氣管擴張症
- 29.有關急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 的敘述，下列何者正確？  
A.嚴重急性呼吸症候群 (SARS)，不會造成急性呼吸窘迫症候群  
B.是一種心因性肺水腫的表現  
C.急性呼吸窘迫症候群的病人，大多死於多重器官衰竭  
D.就急性呼吸窘迫症候群的病程而言，其增生期 (proliferative phase) 通常在第4週之後發生
- 30.全身性類固醇適用於下列何種疾病的治療？  
A. Goodpasture's syndrome  
B. Histiocytosis X  
C. Pulmonary alveolar proteinosis  
D. Idiopathic pulmonary hemosiderosis
- 31.煤礦工人塵肺症 (coal worker's pneumoconiosis) 之胸部X光變化，下列何者錯誤？  
A.常肺門淋巴結腫大  
B.形成結節狀  
C.可形成空洞  
D.可為單側或兩側
- 32.下列何者是間質性肺疾 (interstitial lung disease) 病人呼吸的型態？  
A.換氣過度 (hyperventilation)

- B.吐氣期很長 (prolonged expiratory phase)  
 C.呼吸淺而快  
 D.呼吸不規則
- 33.有關小刀心臟穿刺傷，下列敘述何者錯誤？  
 A.經常造成心包膜填塞  
 B.經常造成出血性休克  
 C.引起之心包膜裂傷經常自動癒合  
 D.引起之心臟裂傷可能會自動癒合
- 34.對於創傷造成游離下巴 (floating mandible) 之病患，不可用何法建立呼吸道？  
 A.將病患維持於坐立且身體前傾之姿勢  
 B.可利用經鼻插管或內視鏡指引經鼻插管  
 C.可使用環狀甲狀軟骨切開術建立外科氣道  
 D.可用喉罩氣道 (laryngeal mask airway)
- 35.關於張力性氣胸 (Tension pneumothorax) 之敘述，下列何者錯誤？  
 A.壓力創傷 (Barotrauma) 是最常見的原因  
 B.臨床表徵常見有心跳加快 (tachycardia)，呼吸困難 (dyspnea)，低血壓 (hypotension)  
 C.臨床上懷疑有張力性氣胸，需照胸部電腦斷層，準備插胸管  
 D.有時須與心包膜腔填塞做鑑別診斷
- 36.連枷胸 (flail chest) 病患常見之臨床表現不包括下列何者？  
 A.不協調呼吸 (paradoxical breathing)  
 B.呼吸困難、心搏過速  
 C.胸部X光片顯示多處多根肋骨骨折  
 D.血氧飽和度增加
- 37.下列何者情況，並不符合成人急性一氧化碳中毒 (Carbon monoxide poisoning) 時，使用高壓氧 (Hyperbaric Oxygen Therapy) 的適應症？  
 A.無意識 (unconsciousness)  
 B.出現神經精神方面的異常 (neuropsychiatric abnormality)  
 C.出現心肌缺血 (cardiac ischemia) 的情況  
 D.Carboxyhemoglobin level 5%
- 38.因為熱氣吸入傷害 (thermal injury) 住院的病人有多少比例會產生急性上呼吸道阻塞？  
 A. < 10%  
 B. 20~30%  
 C. 40~50%  
 D. 60~70%
- 39.急性高山症 (acute mountain sickness) 最常見的症狀為：  
 A.頭痛  
 B.腹瀉  
 C.咳嗽  
 D.小便困難
- 40.臟層肋膜 (visceral pleura) 與壁層肋膜 (parietal pleura) 在肺部何處會相連成一層連續的肋膜層？  
 A.肺門 (hilum)  
 B.心包膜 (pericardium)  
 C.肋骨橫膈交角處 (costophrenic angle)  
 D.氣管 (trachea)
- 41.肋膜發炎引起的肋膜疼痛 (pleuritic pain) 最重要的特徵為：  
 A.深吸氣時最高  
 B.平躺時最痛  
 C.最痛點在胸骨下端  
 D.最痛點在肩胛骨 (scapula)
- 42.有關神經肌肉疾病患者肺功能變化，下列敘述何者正確？①為阻塞型通氣異常 ②胸廓順應性 (compliance) 減少 ③肺活量 (vital capacity) 減少 ④無效腔相對於潮氣容積比率增加  
 A.①②③  
 B.②③④  
 C.①②④  
 D.①③④
- 43.下列何者比較不會受到脊髓灰白質炎 (poliomyelitis) 的侵犯？  
 A.面部肌肉

- B.四肢肌肉
  - C.軀幹肌肉
  - D.呼吸肌肉
- 44.橫膈肌無力患者，不會出現下列那種呼吸型態？
- A.腹式呼吸
  - B.不協調呼吸（paradoxical breathing）
  - C.吸氣時，胸鎖乳突肌（sternocleidomastoid muscle）收縮
  - D.吸氣時，肋間肌肉收縮
- 45.未知原發位置的腺癌，經常可藉由下列何者染色，來幫忙鑑別是肺癌？
- A.表皮生長因子接受體（EGFR）
  - B.甲狀腺轉錄因子-1（TTF-1）
  - C.細胞角蛋白5/6（CK 5/6）
  - D.癌胚抗原（CEA）
- 46.下列何種肺部病灶最可能出現「爆米花」狀的鈣化（popcorn calcification）？
- A.腺癌
  - B.鱗狀細胞癌
  - C.轉移性肺腫瘤
  - D.缺陷瘤（hamartoma）
- 47.肺癌引起上肢及臉部浮腫最常見的原因是：
- A.腫瘤壓迫膈神經
  - B.腫瘤壓迫上腔靜脈
  - C.腫瘤侵犯縱膈腔淋巴腺
  - D.腫瘤侵犯到胸頸部交感神經叢
- 48.肺癌中最容易引起伊蘭二氏症候群（Eaton-Lambert syndrome），導致肌無力的，是何種細胞型態的肺癌？
- A.肺腺癌
  - B.鱗狀上皮細胞肺癌
  - C.小細胞肺癌
  - D.大細胞肺癌
- 49.肺部腫瘤中與抽菸關聯性最低的是：
- A.小細胞肺癌
  - B.鱗狀上皮細胞肺癌
  - C.肺腺癌
  - D.惡性間質瘤
- 50.肺癌常轉移至何處？
- A.骨骼
  - B.甲狀腺
  - C.胃
  - D.乳腺
- 51.下列何者不是阻塞型睡眠呼吸中止症候群造成動脈粥狀硬化（atherogenesis）的機轉？
- A.降低血小板的聚集（platelet aggregability）
  - B.增加血液的凝固性（blood coagulability）
  - C.增加發炎介質（inflammatory mediators）
  - D.增加反應性氧化物的生成（reactive oxygen species）
- 52.關於睡眠陽壓呼吸器調整（CPAP titration）時，要增加病人的接受度，下列敘述何者錯誤？
- A.在睡眠檢查前後，需密集教育病人治療的重要性及替代性治療方式
  - B.小心調整面罩，儘可能減少漏氣及增加病人的舒適度
  - C.不需要注意病人鼻塞與否，把鼻罩戴上即可
  - D.規則使用潮濕器或潮濕器隨時與睡眠陽壓呼吸器（CPAP）共用
- 53.關於阻塞型睡眠呼吸中止症候群（obstructive sleep apnea syndrome）的行為治療，下列敘述何者錯誤？
- A.減重
  - B.戒酒
  - C.使用安眠藥幫助提升睡眠品質
  - D.練習側睡
- 54.鼻罩式陽壓呼吸器應用於阻塞型睡眠呼吸中止症候群的治療，下列敘述何者正確？
- A.面罩漏氣通常不影響治療
  - B.通常需先在睡眠檢查室調整到最適壓力值

- C.呼吸器的壓力調愈高，愈不會呼吸中止，病患感覺比較舒適  
D.鼻塞流鼻水不適合鼻罩使用，應立即改用全臉面罩
- 55.有關偵測睡眠呼吸問題的敘述，下列何者錯誤？  
A.利用溫度或二氧化碳來偵測氣流變化較不準確，因為無法反應氣流大小  
B.利用鼻氣流偵測器來偵測鼻氣流比較實際  
C.利用食道壓力監測來偵測呼吸力道是不準確的方法  
D.在肥胖的人睡眠呼吸中止時胸腹運動幅度可能很小不易察覺
- 56.下列何者檢查結果代表呼吸的神經肌肉系統發生問題造成通氣不足（hypoventilation）？  
A.（A-a）PO<sub>2</sub>不正常，最大吸氣／吐氣壓力下降，0.1秒壓力（P0.1）下降  
B.（A-a）PO<sub>2</sub>正常，最大吸氣／吐氣壓力下降，0.1秒壓力（P0.1）下降  
C.（A-a）PO<sub>2</sub>不正常，最大吸氣／吐氣壓力正常，0.1秒壓力（P0.1）下降  
D.（A-a）PO<sub>2</sub> 正常，最大吸氣／吐氣壓力下降，0.1秒壓力（P0.1）正常
- 57.阻塞性睡眠呼吸中止症病患以正壓呼吸器有效治療時，其效果是：  
A.重度病患長期治療能明顯減少心血管併發症的發生  
B.因為對血壓影響不大，不需調整降血壓藥物  
C.主要的作用在夜間的呼吸障礙，對病患白天的精神完全沒有幫助  
D.雖然阻止睡眠期間呼吸障礙發生，卻因為呼吸器的使用造成病患的生活品質變差
- 58.要診斷阻塞性睡眠呼吸中止症，需要那些評估方式？  
A.只要詢問有沒有打鼾，不必要問太仔細的病史  
B.因為是上呼吸道的問題，不需要安排肺功能檢查以免浪費醫療資源  
C.多頻道睡眠檢查（polysomnography）是目前最準確的檢查工具  
D.整夜脈搏血氧偵測儀（overnight pulse oximetry）執行簡單又不需等候排程，可以完全取代多頻道睡眠檢查（polysomnography）
- 59.下列關於睡眠呼吸障礙的治療，何者錯誤？  
A.因為扁桃腺摘除術有健保給付，可以減少病患負擔，所有新診斷病患一律先安排開刀治療  
B.年輕病患使用口內裝置（oral appliance）可以改變睡眠期間牙齒咬合，進而改善睡眠呼吸障礙  
C.因病患的化學接受體（chemoreceptor）功能失調，如果只有使用氧氣治療必須嚴密監測血液氧氣濃度變化  
D.改善睡眠衛生、減重、避免睡前飲酒等行為治療是最基本的照護
- 60.關於兒童使用呼吸器引發肺炎（ventilator-induced pneumonia）所培養的細菌，下列何者最少見？  
A. *Pseudomonas aeruginosa*  
B. *Bacteroides fragilis*  
C. *Klebsiella pneumoniae*  
D. *Candida albicans*
- 61.下列那一種方法最能促進肺部發育成熟減少新生兒呼吸窘迫症候群（respiratory distress syndrome）的發生？  
A.產前給予類固醇  
B.提早剖腹產  
C.產前給予催產素（oxytocin）  
D.產後給予類固醇
- 62.關於新生兒處置之敘述，下列何者錯誤？  
A.出生之後需要擦乾，減少熱散失  
B.需要評估呼吸、心跳、膚色  
C.如果心跳小於每分鐘一百下，就給予自由流量氧氣  
D.如果給予陽壓呼吸與胸外按壓之後，心跳仍然低於每分鐘六十下，就給腎上腺素藥物
- 63.關於手術治療先天性橫膈膜疝氣之敘述，下列何者錯誤？  
A.應該儘早開刀矯正  
B.開刀可以減少臟器對於肺部的壓迫  
C.開刀無法矯正肺部發育不良  
D.開刀完不需要放胸管引流
- 64.下列何者不是新生兒氣胸發生的原因？  
A.胎便吸入症候群  
B.肺水腫  
C.自發性氣胸  
D.肺間質擴張（pulmonary interstitial emphysema）
- 65.關於新生兒持續性肺高壓（persistent pulmonary hypertension of newborn）的治療，下列何者正確？

- A.吸入性一氧化氮是最佳的治療方式  
B.目前認為利用過度換氣（hyperventilation）引發呼吸性鹼中毒（respiratory alkalosis）是標準的治療方式  
C.提高吐氣末正壓（PEEP）會獲得極明顯的改善  
D.原因為新生兒開放性動脈導管（PDA）
- 66.下列關於高頻震盪呼吸器（HFOV）的敘述，何者正確？  
A.病人吐氣的狀態為被動的形式  
B.HFOV是使用比傳統呼吸器大的潮氣容積，來作為氣體交換  
C.目前HFOV在新生兒肺損傷的使用，是已被認可的  
D.HFOV所使用的平均氣道壓力（mean airway pressure）遠比傳統呼吸器來的低
- 67.肺結核最常見之呼吸道症狀為：  
A.咳嗽，特別是三週以上  
B.咳血  
C.胸痛  
D.呼吸困難
- 68.有關疾病預防下列敘述何者錯誤？  
A.乳房攝影以早期偵測乳癌屬於次級預防  
B.子宮抹片檢查屬於次級預防  
C.肺部復健屬於次級預防  
D.戒菸是屬於初級預防
- 69.阻塞型呼吸道疾病常用定量吸入器，下列何者並非其內常用的藥物？  
A.乙型支氣管擴張劑  
B.抗乙醯膽鹼（anticholinergics）  
C.類固醇  
D.抗生素
- 70.氣喘病人的衛教，下列那一項不是重要技巧之一？  
A.病人需練習才會使用吸入型藥物  
B.第一步是先了解病人目前在意的是那一件事  
C.分幾次個別教導，尖峰流量計使用技巧、紀錄與判讀意義  
D.每次教導時間要夠長
- 71.病患教育中，下列何者是有關病患的能力及體能執行的認知？  
A.Cognitive  
B.Affective  
C.Psychomotor  
D.Skill
- 72.慢性阻塞性肺病的 self-management education 的主要目標是：  
A.減少住院率  
B.減少症狀  
C.減少工作天數損失  
D.改善生活品質
- 73.下列有關乾粉吸入噴霧器（PDI）之敘述，何者錯誤？  
A.靠病人吸入來驅動  
B.所需吸入氣流速較定量吸入器小  
C.吸入氣流速足夠時，肺沉著率與定量吸入器相近或更優  
D.怕潮濕
- 74.下列那些因素會影響氣喘病患吸入類固醇的使用？①教育水準 ②醫病溝通 ③社會文化條件 ④病人態度  
A.僅有①②③  
B.僅有①②④  
C.僅有①③④  
D.①②③④
- 75.當為一塑膠工人作職業性氣喘衛教時，應清楚告知何種物質為其誘發因子？  
A.釩（Vanadium）  
B.洋車前子（Psyllium）  
C.過硫酸鹽（Persulfate）  
D.甲苯氰化物（Toluene diisocyanate）
- 76.下列有關常用小量噴霧器（SVN）之敘述，何者錯誤？  
A.藥液須多於4公撮（mL）

- B.噴霧氣流須6~8公升/分鐘  
C.大力吸入至全肺量  
D.以無菌水清洗噴霧器
- 77.24歲男性，體重120kg，身高170cm，過去健康良好，直到最近一年反覆因為腳腫、喘以及高二氧化碳血症呼吸衰竭插管。住院CXR檢查發現心臟擴大，心臟超音波顯示右心室擴大，左心房及左心室大小正常而且左心室射出率（ejection fraction）60%，估算肺動脈平均壓力為50mmHg。在加護病房中發現病患平躺一段時間後血氧就下降，翻身後血氧會上升。下列何種診斷最可能？
- A.慢性阻塞性肺病  
B.肺栓塞  
C.睡眠呼吸中止症（sleep apnea syndrome）  
D.肥胖通氣不足症候群（obesity hypoventilation syndrome）
- 78.承上題，病患治療以下列那一項最佳？
- A.氣切  
B.Progesterone  
C.抗凝血劑  
D.長期夜間使用非侵襲性正壓呼吸器(NIPPV)
- 79.一位氣喘（asthma）病人，在門診衛教時，說明過去四週中，有時氣喘讓其無法完成一般工作，發生呼吸急促的頻率為每週一次，半夜因咳嗽醒來次數也是每週一次。每天需使用terbutaline（Bricanyl）吸入藥物一次。依照氣喘控制測試（asthma control test），尚少了那一項？
- A.他自認為氣喘控制是否良好  
B.他是否能運動  
C.他是否有依照指示，每日吸類固醇  
D.他是否有定期回診
- 80.承上題，此病人已知項目，總分多少？
- A.4分  
B.6分  
C.8分  
D.10分



# 測驗式試題標準答案

考試名稱：101年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、醫事放射師、助產師、  
 類科名稱：物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試  
 科目名稱：呼吸疾病學(試題代號：6306)

題 數：80題

標準答案：

題號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	D	A	D	C	C	D	C	D	B	A	A	D	D	C	C	B	C	C	D

題號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	D	B	D	C	D	C	D	C	A	A	C	B	D	C	D	D	B	A	A

題號	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	A	B	A	A	B	D	B	C	C	A	A	C	C	B	C	B	A	C	A	D

題號	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	A	C	A	B	A	C	A	C	D	D	C	D	B	D	D	C	D	D	A	D

題號																				
答案																				

備 註：